AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE LOT

Bulletin Herbe

De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

N°19
23 juin 2016

Les Sommes de températures

Degrés-jours cumulés à partir du 1er février *(source : Météo-France)*

Secteur	Station météo	Altitude	2016	*2015 rappel*
Causse central	Lunegarde	383 m	**1538**	*1602*
Bouriane	Gourdon	260 m	**1629**	*1676*
Quercy Blanc	Le Montat	260 m	**1701**	*1755*
Figeacois et Limargue	Faycelles	342 m	**1557**	*1644*
Causse de Limogne	Villefranche de R. / Le Montat	290 m	**1629**	*1686*
Vallée de la Dordogne	Branceille	190 m	**1652**	*1711*
Ségala ouest	Comiac	562 m	**1357**	*1481*
Ségala est	Aurillac	623 m	**1273**	*1398*

Optimiser le séchage du foin au champ

La pluviométrie depuis janvier a été systématiquement excédentaire tous les mois sur l'ensemble du département, avec des pointes en janvier et en mai. Le cumul de précipitations depuis le début de l'année est aujourd'hui supérieur à la normale d'environ 200 mm en dessous de 400 m d'altitude (180 à 230 mm selon les secteurs) et de 460 mm sur le Ségala (Comiac). Ces conditions fraîches et humides ont favorisé la pousse de l'herbe sur mai et juin, ce qui a été bénéfique aux prairies pâturées, mais ont fortement perturbé les récoltes de foin.

Rappel pour optimiser les fenêtres météo :

- Faucher dès la disparition de la rosée et faner rapidement après la fauche pour un séchage maximal au soleil le premier jour.
- Aérer au maximum les andains. Faucher à 7 cm de hauteur minimum permet la circulation de l'air sous l'andain.
- Presser à 80% de MS, idéalement le matin juste après la disparition de la rosée, pour limiter la perte de feuilles. En dessous de 80%, il y a risque de chauffe et de perte de valeur alimentaire. Presser de manière homogène sans tassement excessif. Pour éviter l'échauffement, les bottes rondes peuvent rester au champ une vingtaine de jours avant leur stockage.

Retourneurs et aérateurs d'andains : Ces matériels innovants permettent de sécher le foin en andain grâce à plusieurs retournement successifs. Ils sont efficaces pour limiter la perte de feuilles des fourrages contenant des légumineuses et préserver la qualité. Ils sont tout particulièrement recommandés pour le séchage du foin de luzerne. Deux ou trois retournements minimum sont nécessaires. Il existe plusieurs marques et plusieurs systèmes sur le marché.

Fabien Bouchet-Lannat - Chambre d'Agriculture du Lot - tel 05 65 23 22 22
ou votre conseiller de secteur

AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE

La Chambre d'Agriculture du Lot est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

Pour recevoir ce bulletin par e-mail, écrivez à : herbe@lot.chambagri.fr
Retrouvez les Bulletins Herbe sur : www.lot.chambagri.fr